



University of Groningen

Screening op (pre)maligne afwijking van de cervix uteri in Noord-Nederland : Een studie van de resultaten van het cytologisch onderzoek van de cervix binnen en buiten het kader van het bevolkingsonderzoek

Zanten, Alje van

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1985

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Zanten, A. V. (1985). Screening op (pre)maligne afwijking van de cervix uteri in Noord-Nederland : Een studie van de resultaten van het cytologisch onderzoek van de cervix binnen en buiten het kader van het bevolkingsonderzoek. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen behorend bij het proefschrift: Screening op (pre)maligne afwijkingen
van de cervix uteri in Noord-Nederland, 12 juni 1985.

Stellingen.

1. Screening naar (pre)maligne afwijkingen van de cervix leidt tot een belangrijke daling van de morbiditeit en mortaliteit door het cervixcarcinoom. Deze daling komt het duidelijkst tot uiting in landen waar sprake is van een bevolkingsonderzoek en waar een goede registratie, follow-up en getalsbewerking van de cytologische en histologische gegevens bestaat.
2. De gerichte oproep in de vorm van een oproepkaart is voor een goed verloop van het bevolkingsonderzoek onmisbaar en verdient de voorkeur boven een oproep via een advertentie of een artikel in de krant.
3. De kwaliteitscontrole van het cytologisch onderzoek van de cervix kan worden bevorderd door de invoering van een goede uniforme - bij voorkeur persoonsgebonden - landelijke registratie van alle cytologische en histologische gegevens betreffende onderzoek naar (pre)maligne afwijkingen van de cervix.
4. Het is aan te bevelen om een landelijk geldend diagnostisch protocol te gebruiken voor patiënten waarbij een PAP IIIA dan wel KOPA P = geringe of matige dysplasie is gevonden.
5. De uitgebreide maatregelen voor kwaliteitscontrole bij het cervixcytologisch onderzoek zoals voorgesteld door de Cie. Cytologie van de Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging duiden erop dat in de praktijk dit onderzoek lang niet zo betrouwbaar is als veelal wordt aangenomen.
6. Bij de kosten-baten analyse van screening van alle zwangeren op neuraalbuisdefecten van de foetus door middel van serum alfafoetoproteïne bepaling wordt te weinig rekening gehouden met de vraag of een op deze wijze gevonden neuraalbuisdefect in alle gevallen een zwangerschapsafbreking rechtvaardigt. (naar aanleiding van H. Weitzel: Alpha-fetoproteïne in der Geburtshilfe, Gynäkologe 16:148 (1983)).
7. Bij zwangeren met ideopatische thrombocytopenische purpura (ITP) is primaire sectio caesarea niet aangewezen.
8. Bij patiënten met langdurig broomisoval gebruik en bij wie tengevolge daarvan irreversibele cerebellaire functiestoornissen lijken op te treden, is voor het opsporen van cerebellaire atrofie CT-scan onderzoek gewenst. (van Balkom, A.J.L.M. e.a.: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 48:342-347 (1985)).
9. De term "minimal brain damage" (MBD) is nietszeggend. Een meer descriptieve operationele groep van definities is nodig bij zgn. MBD-kinderen zonder dat van één bepaalde etiologie wordt uitgegaan. (H. van der Vlugt, Arts en Wereld, 1983).

10. Het hebben (gehad) van mammacarcinoom wordt door vrouwen erger ervaren dan het hebben (gehad) van cervixcarcinoom. (Minie Kaiser en Mettiena Leemeijer, Medische Sociologie, RU Groningen, 1983).
11. Bij patiënten met urine incontinentie is het van belang te vragen naar het gebruik van medicamenten die de functie van blaas en urethra kunnen beïnvloeden.
12. Proteus-infectie van de urine? Zoek de steen! J.F.M. Slors e.a. Ned. T. Geneesk. 126:225 (1982).
13. Bij een patiënte met acute polyarthritis moet ook aan een infectie met human parvovirus (HPV) worden gedacht. (D.G. White: Human parvovirus arthropathy, The Lancet, February 23, 419 (1985)).
14. De door de overheid voorgestelde maatregelen welke er op gericht zijn de vruchtbaarheid van de Nederlandse bevolking te beïnvloeden met als doel de 'vergrijzing' van de bevolking een halt toe te roepen zijn in strijd met het beleidsvoornemen van deze regering om individualisering en deregulering van maatschappelijke processen te bevorderen.
15. Medische apparatuur dient te worden onderworpen aan een vergelijkend kwaliteitsonderzoek.
16. "Met de noorderzon vertrekken" betekent vaak de zuiderzon opzoeken.

A. van Zanten.

